

Compagel® vet. 250 g

Indehaver af markedsføringstilladelsen: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Binger Str. 173, 55216 Ingelheim, Tyskland.

Fremstiller: C.P.M. ContractPharma GmbH & Co KG, Frühlingsstrasse 7, 83620 Feldkirchen-Westerham, Tyskland.

Aktive stoffer og andre indholdstoffer: 100 g gel indeholder:

Aktive stoffer: Heparinnatrium 50.000 IE, levomenthol 0,5 g, hydroxyethylsalicylat 5,0 g.

Hjælpestoffer: Renset vand, 2-Propanol, Propylenglycol, Carbomer 980, Macrogolglycerolcoccoat, Chlorophyllin-kobber-kompleks trinatriumsalt (E141), Trolamin.

Indikationer: Behandling af lokale inflammatoriske hævelser og slag herunder tendonitis, tenosynovitis, bursitis og andre akutte inflammatoriske tilstande af hestens muskler, knogler og led. Under akutte inflammatoriske tilstande, hvor ødematøs hævelse og hæmatom er opstået, fremmer Compagel vet. en hurtig reabsorption.

Kontraindikationer: Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer eller et eller flere af hjælpestofferne. Må ikke anvendes på beskadiget hud.

Bivirkninger: Ingen kendte.

Hvis De bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne indlægsseddel, bedes De kontakte Deres dyrlæge. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Dyrets ejer kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Skema og vejledning findes under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted.

Dyreart: Hest.

Dosering, anvendelsesmåde og indgivelsesvej: Den samlede daglige dosis er maksimum 50 g gel. Gelen appliceres ved tryk med fingerspidserne på det angrebne område ifølge dyrlægens instruktioner, indtil symptomerne forsvinder. *Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have udskrevet lægemidlet til anden brug og/eller med en anden dosering end angivet i denne indlægsseddel. Følg dog altid dyrlægens anvisning.*

Oplysninger om korrekt anvendelse: Se ovenfor: dosering, anvendelsesmåde og indgivelsesvej.

Tilbageholdelsestid: Slagtning: 0 døgn. Må ikke anvendes til hopper, hvis mælk er bestemt til menneskekonsum.

Eventuelle særlige forholdsregler vedrørende opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares over 25°C. Opbevaringstid efter første åbning af tuben: 3 måneder.

Særlige advarsler: Forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr: Undgå kontakt med øjne eller slimhinder. Må ikke anvendes på åbne sår eller åbne og skorpebelagte hudlæsioner. Behandlingen stoppes i tilfælde af bivirkninger. Forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet: Undgå kontakt med åbne sår eller øjne. Brug uigennemtrængelige handsker når produktet anvendes. Anvendelse under drægtighed og laktation: Der foreligger ingen kliniske data for topikal anvendelse af Compagel vet. under drægtighed. Anvendelse frarådes under drægtighed og laktation.

Bortskaffelse af ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne: Lægemidler må ikke bortskaffes sammen med spildevand eller husholdningsaffald. Medicinrester afleveres til apotek/leverandør eller ved kommunal modtageordning for destruktion.

Dato for seneste godkendelse af indlægssedlen: September 2008.

Andre oplysninger: 250 g

Yderligere oplysninger om dette

lægemiddel fås hos:

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Strødamvej 52

2100 København Ø